




VOQUEZNA TriplePak[®]
vonoprazan tablets 20 mg
amoxicillin capsules 500 mg
clarithromycin tablets 500 mg



VOQUEZNA DualPak[®]
vonoprazan tablets 20 mg
amoxicillin capsules 500 mg

EL PODER DE AYUDAR A COMBATIR LA INFECCIÓN POR LA *H. PYLORI*

**Obtenga información
sobre la *H. pylori* y un
tratamiento único de 14 días**



**Obtenga más
información
sobre las
opciones de
ahorro
(páginas 10 y 11)**

INDICACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué son VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK?

- VOQUEZNA[®] TRIPLE PAK[®] (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules, clarithromycin tablets) y VOQUEZNA[®] DUAL PAK[®] (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules) son medicamentos con receta coenvasados para el tratamiento de una infección bacteriana por *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) en adultos.
- Se desconoce si VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK son seguros y eficaces en niños.
- Para reducir el desarrollo de bacterias farmacorresistentes y mantener la eficacia de VOQUEZNA TRIPLE PAK, VOQUEZNA DUAL PAK y otros fármacos antibacterianos, estos productos deben utilizarse solo para tratar o prevenir infecciones que se han demostrado o se sospecha firmemente que están causadas por bacterias susceptibles.

No tome VOQUEZNA TRIPLE PAK si:

- se sabe que tiene alergia o es sensible a los componentes de VOQUEZNA TRIPLE PAK (vonoprazan, amoxicillin, clarithromycin), antibióticos macrólidos (como azithromycin y erythromycin) o penicillin.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la Información de prescripción completa.

INFORMACIÓN ESENCIAL SOBRE LA INFECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE *H. PYLORI*



La *H. pylori* es una infección bacteriana que se produce en el estómago

La infección puede causar síntomas como dolor o sensación de quemazón en el estómago, náuseas, distensión, pérdida del apetito y eructos frecuentes.



La *H. pylori* debe tratarse cuando se detecte si hay síntomas o no, ya que es contagiosa. No recibir tratamiento para la *H. pylori* aumenta el riesgo de problemas de salud relacionados.

La *H. pylori* es frecuente

Se calcula que el 50 % de la población mundial y el 36 % de la población estadounidense tienen infección por *H. pylori*.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

No tome VOQUEZNA TRIPLE PAK si:

- está tomando:
 - medicamentos que contienen rilpivirine (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY)
 - pimozide
 - colchicine, si tiene problemas renales o hepáticos
 - lomitapide, lovastatin y simvastatin
 - alcaloides ergóticos (ergotamine o dihydroergotamin)
 - lurasidone
- tiene antecedentes de coloración amarillenta de la piel (ictericia) o problemas hepáticos al tomar clarithromycin.
- está embarazada o planea quedar embarazada, excepto en circunstancias clínicas en las que su proveedor de atención médica haya determinado que no existe una terapia alternativa adecuada. La clarithromycin, un medicamento en VOQUEZNA TRIPLE PAK, puede dañar al feto.

No recibir tratamiento para la *H. pylori* puede provocar problemas de salud

Estas inquietudes de salud incluyen irritación e hinchazón del estómago, llagas en el revestimiento protector del estómago llamadas úlceras y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer de estómago.



Es importante que complete su tratamiento de 14 días basado en VOQUEZNA

Tomar todo el medicamento recetado por su médico según las indicaciones ayuda a aumentar la probabilidad de eliminar la infección por *H. pylori*.



Si experimenta efectos secundarios que le preocupan, pregunte a su médico si debe interrumpir el tratamiento.

Obtenga más información sobre lo que hace que su tratamiento sea único en [VOQUEZNA.com/HP](https://www.wock.com/HP)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

No tome VOQUEZNA DUAL PAK si:

- se sabe que tiene alergia o es sensible a los componentes de VOQUEZNA DUAL PAK (vonoprazan, amoxicillin) o penicillin.
- está tomando medicamentos que contienen rilpivirine (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY).

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).

SU RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE *H. PYLORI* CONTIENE ANTIBIÓTICOS Y UN BLOQUEADOR DE ÁCIDOS, VONOPRAZAN



Un bloqueador eficaz de ácido es importante para que el tratamiento tenga éxito

Los bloqueadores de ácido hacen que el estómago sea menos ácido, lo que ayuda a que los tratamientos para la *H. pylori* funcionen mejor. En su régimen basado en VOQUEZNA, el vonoprazan es el bloqueador de ácido.



Vonoprazan actúa rápidamente para reducir el ácido del estómago

En un estudio en adultos sanos, vonoprazan comenzó a bloquear el ácido en un plazo de 2 a 3 horas.



Vonoprazan se puede tomar con o sin alimentos

A diferencia de otros bloqueadores de ácido, no hay requisitos alimentarios con vonoprazan.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Antes de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- está embarazada, cree que podría estar embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si VOQUEZNA dañará a su feto.
 - **Registro de exposición durante el embarazo:** hay un registro de embarazos para mujeres que toman VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK durante el embarazo. La finalidad de este registro es recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si está embarazada o se queda embarazada durante el tratamiento con VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK, hable con su proveedor de atención médica sobre cómo puede unirse a este registro de embarazo o puede inscribirse en el registro llamando al 1-866-609-1612 o visitando <https://voqueznapregnancyregistry.com/>.

Los bloqueadores de ácido ayudan a los antibióticos a funcionar mejor

Los antibióticos matan las bacterias de *H. pylori* para eliminar la infección. Funcionan mejor cuando hay menos ácido en el estómago.

Tomar un bloqueador de ácido, como vonoprazan, junto con antibióticos, mejora la probabilidad de eliminar la infección.



Estos regímenes basados en VOQUEZNA son medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Antes de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- está amamantando o planifica hacerlo. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si tomará VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK mientras está amamantando.
- tiene problemas de hígado o riñón.
- tiene miastenia gravis.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Puede haber efectos secundarios graves cuando algunos se usan en combinación con este producto. Pueden producirse reacciones adversas graves con VOQUEZNA TRIPLE PAK debido a interacciones farmacológicas de clarithromycin con colchicine, algunos agentes hipolipemiantes, algunos bloqueadores de canales de calcio y otros fármacos.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).

REGÍMENES DE TRATAMIENTO APROBADOS POR LA FDA PARA AYUDARLE A ELIMINAR LA INFECCIÓN



Probado en un ensayo clínico para eliminar la infección por *H. pylori*

En un ensayo clínico, se demostró que VOQUEZNA® Triple Pak® y VOQUEZNA® Dual Pak® se deshacen de la infección por *H. pylori* en más del 77 % de los pacientes después de un tratamiento de 14 días (en comparación con el 69 % con lansoprazole, amoxicillin y clarithromycin).



Posibles efectos secundarios de su medicamento recetado

En un ensayo clínico, los efectos secundarios frecuentes incluyeron: diarrea, alteración del sentido del gusto, infección vaginal por levaduras, dolor de estómago, dolor de cabeza, presión arterial alta y síntomas similares al resfriado.

Es posible que se produzcan otros efectos secundarios más graves. Consulte la Información importante de seguridad incluida en todo este folleto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK?

VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Reacciones alérgicas (hipersensibilidad):** Llame a su médico inmediatamente si tiene erupción, urticaria u otros cambios en la piel, hinchazón de la cara o dificultad para respirar.
- **Un tipo de problema renal (nefritis tubulointersticial aguda):** Algunas personas que toman vonoprazan, un componente de VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK, pueden desarrollar un problema renal llamado nefritis tubulointersticial aguda. Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta una disminución de la cantidad de orina o si observa sangre en la orina.
- **Reacciones cutáneas graves:** VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar reacciones cutáneas graves, como erupción cutánea o reacción alérgica en o dentro de cualquier parte del cuerpo. Los síntomas también pueden incluir, entre otros, fiebre, escalofríos, dolores corporales o dificultad para respirar. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK inmediatamente y llame a su médico de inmediato.



“Aproximadamente un mes después de completar mi tratamiento de 14 días, mi médico me hizo la prueba y confirmó que la infección había desaparecido. ¡Espero que pueda funcionarle tan bien como a mí!”

Los resultados individuales pueden variar.

—LaDawn,
paciente del ensayo clínico para VOQUEZNA® Dual Pak®

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK?

VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Hipersensibilidad gastrointestinal (síndrome de enterocolitis inducida por fármacos):** se ha notificado un tipo de reacción alérgica que causa inflamación en el intestino delgado y grueso con el uso de amoxicillin, un componente de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK, principalmente en pacientes ≤ 18 años de edad. Los síntomas incluyen vómitos que ocurren entre 1 y 4 horas después de tomar el fármaco y también pueden estar asociados a palidez de la piel, cansancio, presión arterial baja, shock y diarrea en las 24 horas posteriores a la toma de amoxicillin. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK y notifique a su médico.
- **Diarrea intensa:** llame a su médico inmediatamente si tiene heces acuosas, dolor de estómago y fiebre que no desaparece mientras toma VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK o después de completar la terapia.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).

SU MÉDICO RECETÓ UNA DE ESTAS OPCIONES BASADAS EN VOQUEZNA PARA USTED



Tome sus medicamentos 2 veces por día: por la mañana y por la noche, con 12 horas de diferencia.



VONOPRAZAN (EL BLOQUEADOR DE ÁCIDO)
CLARITHROMYCIN (UN ANTIBIÓTICO)
AMOXICILLIN (UN ANTIBIÓTICO)

Las pastillas no se muestran en su tamaño real.

Tratamiento de 14 días que se puede tomar con o sin alimentos

SI OMITI UNA DOSIS DE VOQUEZNA® TRIPLE PAK®

Tome la siguiente dosis lo antes posible, a menos que hayan transcurrido 4 horas desde que se suponía que debía tomarla. Si han pasado más de 4 horas, salte la dosis omitida y, a continuación, tome la siguiente dosis a tiempo. Siga tomando su medicamento hasta que haya tomado todas las dosis del envase, incluso si los síntomas desaparecen.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)


¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK?

VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Erupción cutánea en pacientes con mononucleosis:** La Amoxicillin (un componente de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK) puede causar erupción cutánea en pacientes con mononucleosis. Deje de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK si le diagnostican mononucleosis y llame a su médico inmediatamente.
- **Resultados alterados de la prueba para algunos tumores:** VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK reducen el ácido del estómago, lo que puede provocar un aumento de los niveles de una proteína denominada (CgA) en la sangre. Cuando se aumenta este nivel, pueden alterarse los resultados de la prueba para detectar algunos tumores. Informe a su médico del uso de VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK antes de los análisis de sangre.



Tome sus medicamentos 3 veces por día: por la mañana, a mediodía y por la noche.



VONOPRAZAN (EL BLOQUEADOR DE ÁCIDO)
AMOXICILLIN (UN ANTIBIÓTICO)

Las pastillas no se muestran en su tamaño real.

Tratamiento de 14 días que se puede tomar con o sin alimentos

SI OMITI UNA DOSIS DE VOQUEZNA® DUAL PAK®

Tome la siguiente dosis lo antes posible, a menos que hayan transcurrido 4 horas desde que se suponía que debía tomarla. Si han pasado más de 4 horas, salte la dosis omitida y, a continuación, tome la siguiente dosis a tiempo. Siga tomando su medicamento hasta que haya tomado todas las dosis del envase, incluso si los síntomas desaparecen.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Además, VOQUEZNA TRIPLE PAK puede causar:

- **Latidos irregulares:** la clarithromycin puede causar latidos cardíacos irregulares. Llame a su médico inmediatamente si siente que va a desmayarse, se siente mareado o si su corazón late irregularmente.
- **Problemas hepáticos:** llame a su médico inmediatamente si tiene alguno de los siguientes síntomas: pérdida de peso, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia), orina oscura, erupción cutánea o dolor en el lado derecho del abdomen.

Los efectos secundarios más frecuentes pueden incluir:

- diarrea
- cambios temporales en el sentido del gusto
- infección vaginal por levaduras
- dolor de estómago
- dolor de cabeza
- presión arterial alta y
- síntomas similares al resfriado

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).

OFERTAS DE AHORRO Y APOYO



Su médico puede enviar su receta a BlinkRx*

BlinkRx ayuda a identificar posibles ahorros disponibles para usted. Phathom Pharmaceuticals y BlinkRx trabajan juntos para ayudar a que le resulte sencillo recibir VOQUEZNA® Triple Pak® o VOQUEZNA® Dual Pak®.

BLINKRx



Fácil de usar. BlinkRx se coordina con su seguro en su nombre.



Obtenga el costo de bolsillo más bajo que tenga a su disposición. BlinkRx identifica el costo de su medicamento y la cobertura del seguro que tiene, y aplica las ofertas de ahorro para las que es elegible.




Entrega gratuita a domicilio. Un socio farmacéutico le entregará su receta gratuitamente a su puerta.

Después de que su médico envíe su receta, BlinkRx se comunicará con usted para comunicarle los detalles sobre cómo registrarse y utilizar su servicio. También tiene la opción de registrarse usted mismo ahora al 1 (844)-759-0782.

Puede que sea elegible para esta tarjeta de ahorro

Si tiene un seguro comercial, es posible que pueda ahorrar en su receta. Puede registrarse para una tarjeta de ahorros [aquí](#).



Haga clic [aquí](#) para ver los términos y condiciones completos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

*BlinkRx NO es un seguro. Al enviar su receta a BlinkRx, usted autoriza a BlinkRx ("Blink") a enviar notificaciones por mensajes de texto relacionadas con sus recetas. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes varía. Es posible que los mensajes SMS estándar no sean totalmente seguros. Proporcionar el consentimiento no es una condición para comprar bienes o servicios a través de Blink. Puede responder a cualquier texto con "HELP" (Ayuda) para obtener ayuda o "STOP" (Detenerse) para detener y revocar su consentimiento. Visite el Aviso de privacidad según la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) y los Términos de uso de Blink en www.blinkrx.com/legal.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción](#) completa.



APROBADO POR LA FDA: UN TRATAMIENTO ÚNICO DE 14 DÍAS



Contiene el bloqueador de ácido vonoprazan, que comienza a bloquear el ácido rápidamente y ayuda a mejorar la capacidad de los antibióticos para matar las bacterias de *H. pylori*



Se ha demostrado en un ensayo clínico que elimina la *H. pylori* en la mayoría de los pacientes después de 14 días de tratamiento



Se puede tomar con o sin alimentos



Los efectos secundarios más frecuentes pueden incluir: diarrea, alteración del sentido del gusto, infección vaginal por levaduras, dolor de estómago, dolor de cabeza, presión arterial alta y síntomas similares al resfriado

**Para obtener más información,
comuníquese con su médico o
visite VOQUEZNA.com/HP**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Información general sobre el uso seguro y eficaz de VOQUEZNA.

En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos de los que se enumeran en el folleto informativo para el paciente. No utilice VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK para una afección para la cual no fueron recetados. No administre VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño.

Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Se le anima a notificar sospechas de reacciones adversas poniéndose en contacto con Phathom Pharmaceuticals al 1-888-775-PHAT (7428 o la FDA al 1-800 FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch).

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la Información de prescripción completa.